

NOTA INFORMATIVA SOBRE REACCIONES A LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA EN INDIVIDUOS QUE YA HAN PASADO LA ENFERMEDAD

21 Enero 2021

Con el comienzo del programa de vacunación masiva en la población sanitaria se está administrando la vacuna a un conjunto de individuos que debido a su ejercicio profesional han estado más expuestos al virus, estimándose un porcentaje general de afectados en torno al 24% (informe sobre sanitarios del ISCIII, Mayo 2020). En el caso de estas personas que ya han pasado la enfermedad, desde la Sociedad Española de Inmunología queremos advertir que la vacunación contaría como un segundo contacto con el virus, y dado el mecanismo habitual de funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, este responderá de una forma más vigorosa a la administración de la vacuna. Por tanto, no es de extrañar que el número de reacciones locales/sistémicas débiles/moderadas se notifiquen en una mayor proporción de lo esperable si se hubiese vacunado a un conjunto de individuos que nunca hubiesen estado antes en contacto con el virus.

Desde la Sociedad Española de Inmunología queremos resaltar que estas reacciones no son sinónimo de ninguna reacción alérgica y que son las habitualmente observadas en cualquier campaña de vacunación. Estas reacciones no deben contraindicar la administración de la vacuna, manteniendo la transparencia de su comunicación pero teniendo en cuenta el status inmunológico de los individuos que las presentan y que sólo expresan el habitual aumento de reactogenicidad de las vacunas en sucesivas dosis.